

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketaatan perawat menjalankan *bundle phlebitis* sebagian besar 45 orang (55,6%) dalam kategori taat.
2. Kejadian *phlebitis* sebagian besar yaitu 54 orang (66,7%) tidak terjadi.
3. Hasil uji *Spearman Rho* didapatkan angka p value sebesar $0,001 <$ dari tingkat signifikansi ditentukan yaitu 0,05, hasil ini menunjukkan ada korelasi *bundle phlebitis* dengan kejadian *phlebitis* di ruang rawat inap Rumah Sakit Tk. II Udayana. Nilai *coefisien corelation* sebesar 0,791 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel penerapan *bundle phlebitis* dengan variabel kejadian *phlebitis*, jadi semakin baik pelaksanaan *bundle phlebitis* maka kejadian *phlebitis* akan semakin menurun.

B. Saran

1. Bagi Pelayanan Keperawatan

Perawat sebagai pemberi layanan keperawatan diharapkan mampu melakukan tindakan keperawatan secara professional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) *bundle phlebitis*.

4. Bagi Pendidikan Keperawatan.

Diharapkan *bundle phlebitis* dapat menambah wawasan perawat dan dijadikan sebagai pedoman tindakan keperawatan dalam upaya untuk mencegah kejadian *phlebitis* sehingga dapat memperpendek hari perawatan dan biaya perawatan di rumah sakit.

5. Bagi Rumah sakit

Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan penurunan angka kejadian *phlebitis* sebagai indikatornya.

6. Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya mampu mengembangkan penelitian serupa terkait manfaat dari ketaatan menjalankan *bundle phlebitis* terhadap kejadian *phlebitis* dalam upaya mencegah kejadian *phlebitis*.